

## 【CO2 レーザーサージカル（ほくろ・イボ・脂漏性角化症等）施術前後の注意事項】

### ■治療について

CO2 レーザーは皮膚の水分に反応し、病変を蒸散・除去する治療です。  
ほくろ・イボ・脂漏性角化症などの良性病変に適応があります。

---

### ■施術前の注意事項

- ・治療部位に強い炎症・感染がある場合は施術できないことがあります。
  - ・麻酔（クリームまたは局所麻酔）を使用します。
  - ・麻酔薬や外用薬にアレルギーがある方は必ず申告してください。
  - ・日焼け直後の施術は色素沈着のリスクが高くなります。
  - ・基礎疾患（糖尿病・高血圧・心疾患・悪性疾患など）がある方は事前にお知らせください。
- 

### ■施術後の経過

- ・赤み、腫れ：1～3 日程度持続し、1 週間前後で徐々に消失します。
  - ・軽度の出血や滲出液が出ることがあります。
  - ・2～3 日がかさぶた形成、1～2 週間で自然に脱落します。
- 

### ■施術後の注意事項

- ・治療部位は2～3 日間水に濡らさないでください。
  - ・患部はこすらず、清潔を保ってください。
  - ・処方された軟膏を必ず使用してください。
  - ・かさぶたは絶対に無理に剥がさないでください。
  - ・ほくろ治療の場合、痂皮がはがれた後に小さな穴があく可能性があります。
  - ・施術部位に腫脹、発赤、疼痛などの感染兆候があれば早めに受診してください。
- 

### ■生活上の注意

- ・約1 週間は激しい運動、サウナ、長時間の入浴、飲酒を控えてください。
  - ・紫外線対策（日焼け止め・帽子等）を徹底してください。
- 

### ■リスク・副作用

- ・炎症後色素沈着（PIH）。
- ・赤みの遷延。
- ・瘢痕形成。
- ・感染・炎症。
- ・再発または取り残し。

※病変の深さによっては1回で完全に除去できない場合があります。

---

■再治療について

場合によっては1~2か月後に再治療することが可能です。